ROSA FOETIDA.

R. Calicum tubis ovatis pedunculisque hispidis; petiolis aculeatis, aculeus sparsis subrectis; foliolis ovato-acutis, subtus pubescentibus. BAST. supp. à la Fl. de M.-et-L., p. 29. DC. Fl. franç. 6, p. 534. Non Herm. Dissert. p. 18. Non Alexon Flora ped. W 1792.

LE ROSIER A FRUITS FÉTIDES.

DESCRIPTION.

C'est un achrisseau qui s'élève en buisson à la hauteur de cinq a six pieds. Ses tiges glatures, sont armées d'aiguillons les branches stériles : ceux qui se trouveut près des stipules sont presque gémines. Les feuilles se composent de cinq, de sept, et par-fois de neuf folioles glabres en-dessus, pubescentes en-dessous, très-entières, souvent échancrées en cœur à leur base, pointues au sommet, doublement dentées, à dents serraturées; elles sont portées par un pétiole velu, glanduleux, muni de quelques petits aiguillons recourbés qui se prolongent souvent jusques sur la nervure principale de la foliole impaire. Les stipules sont diaphanes, bisides, pointues au sommet, et glanduleuses. Les fleurs, assez petites, presque inodores, naissent généralement solitaires; mais on en trouve quelquesois deux ou trois ensemble, réunies à l'extrémité des petites branches qui croissent le long des rameaux principaux. Le tube du calice petit, ovoide-allongé, le pédoucule qui le supporte ainsi que les divisions pinnatifides du limbe, sont hérissés de poils spiniformes et glanduleux. Les cinq pétales

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

